

Tome la iniciativa y hable sobre sus objetivos del tratamiento contra el lupus

Esta Guía de conversación con el médico está diseñada para ayudarle a hablar con su médico sobre su plan de tratamiento y sus objetivos.



Establezca sus objetivos

Seleccione todas las opciones que correspondan.

- ☐ Quiero disminuir la actividad de la enfermedad. ☐ Quiero disminuir los efectos secundarios de los medicamentos.
- ☐ Quiero abordar el uso de esteroides. ☐ Mis otros objetivos: _____
- ☐ Quiero disminuir los brotes. _____



Comparta su experiencia

"He estado en mi tratamiento actual durante _____ año(s) y _____ mes(es)."

"Mi plan de tratamiento actual incluye..."

Indique los medicamentos para el lupus que actualmente usa.

Si usa esteroides y conoce su dosis, indique su dosis diaria: _____ mg/día.

"Los síntomas del lupus que más afectan cómo me siento son..."

Seleccione todos los síntomas* de lupus que actualmente experimenta.

- ☐ Erupción cutánea ☐ Sensibilidad al sol ☐ Dolor abdominal ☐ Pérdida de cabello ☐ Confusión
- ☐ Dolor en las articulaciones ☐ Úlceras bucales ☐ Fatiga ☐ Dolor muscular

Escriba los síntomas adicionales aquí: _____

- ☐ Marque esta casilla si alguno de sus síntomas son nuevos desde su última visita al médico.

* Comuníquese con su médico para obtener asesoramiento médico y analizar los síntomas.

"Más recientemente, mis síntomas de lupus me hicieron..."


Seleccione todas las formas en que el lupus le afecta.

- ☐ Cancelar salidas sociales. ☐ Faltar al trabajo o no poder dar todo de mí. ☐ Ajustar o abandonar mis rutinas.
- ☐ Ausentarme parcialmente de momentos con mis familiares y amigos. ☐ Detener la mayor parte de mi actividad física. ☐ Cuestionar mis expectativas para el futuro.

También puede escribir cómo le afecta el lupus aquí: _____

"Mis exacerbaciones de lupus se presentan..."

Seleccione uno.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

- No use SAPHNELO si es alérgico a anifrolumab-fnia o a cualquiera de los ingredientes.
- Antes de recibir SAPHNELO, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluidas las siguientes situaciones:
 - cree que tiene una infección o tiene una infección que sigue reapareciendo; o
 - tiene una cita para recibir una vacuna o cree que podría necesitar una vacuna. No debe recibir vacunas con virus vivos durante el tratamiento con SAPHNELO

Consulte la [Información de seguridad importante](#) adicional en su totalidad y la [Información de prescripción](#) completa, incluida la [Información para el paciente](#).



Pregunte si agregar SAPHNELO a su plan de tratamiento es adecuado para usted

1. ¿Podría SAPHNELO ayudar a reducir la actividad de la enfermedad y abordar algunos de mis síntomas?
2. ¿Podría SAPHNELO ayudarme a abordar el uso de esteroides?
3. ¿Podría SAPHNELO ayudarme a disminuir las exacerbaciones de lupus?
4. ¿SAPHNELO tiene algún efecto secundario?

Preguntas adicionales para hacerle a su médico:

- ☐ ¿Tendré que seguir usando mis otros medicamentos para el lupus si uso SAPHNELO?
- ☐ ¿Cómo funciona un producto biológico como SAPHNELO y qué lo hace diferente de otros medicamentos para el lupus?
- ☐ ¿Cuánto tarda SAPHNELO en hacer efecto?
- ☐ ¿Cómo se administra SAPHNELO?
- ☐ ¿Cuánto tiempo dura una infusión de SAPHNELO?



Lleve un registro de sus pensamientos

Use este espacio para anotar ideas o preguntas adicionales que tenga antes de visitar al médico. También puede usar este espacio para tomar notas mientras analiza su plan de tratamiento.

Analice su plan de tratamiento con su médico para saber si agregar SAPHNELO podría ayudarlo a alcanzar sus objetivos del tratamiento.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

- **Antes de recibir SAPHNELO, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluidas las siguientes situaciones (continuación):**
 - Tiene o ha tenido cáncer.
 - Recibe otros medicamentos biológicos o anticuerpos monoclonales.
 - Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si SAPHNELO dañará al bebé en gestación. Informe a su proveedor de atención médica si está embarazada o si podría o planea estarlo durante el tratamiento con SAPHNELO.
 - Existe un registro de exposición durante el embarazo mediante el cual se supervisa el desenlace de los embarazos en mujeres que estuvieron expuestas a SAPHNELO. Para obtener más información sobre el registro, llame a AstraZeneca al 1-877-693-9268.
 - Está amamantando o planea hacerlo. Se desconoce si SAPHNELO pasa a la leche materna.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que usa, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. SAPHNELO puede afectar el funcionamiento de otros medicamentos; y otros medicamentos pueden afectar el funcionamiento de SAPHNELO.

Consulte la [Información de seguridad importante](#) adicional en su totalidad y la [Información de prescripción](#) completa, incluida la [Información para el paciente](#).

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

SAPHNELO puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- **Infecciones graves:** SAPHNELO puede disminuir la capacidad del sistema inmunitario para combatir infecciones. Puede que tenga un mayor riesgo de contraer infecciones respiratorias y culebrilla (herpes zóster) durante el tratamiento con SAPHNELO. Las infecciones podrían ser graves y provocar la hospitalización o la muerte.
- **Reacciones alérgicas (hipersensibilidad),** incluida la anafilaxia: pueden ocurrir reacciones alérgicas graves durante la infusión de SAPHNELO o después de esta. Informe a su proveedor de atención médica o busque ayuda de emergencia de inmediato si presenta alguno de los siguientes síntomas de una reacción alérgica grave:
 - hinchazón de la cara, la boca y la lengua
 - dificultad para respirar
 - desmayos, mareos
 - sensación de desvanecimiento (presión arterial baja)
- **Cáncer:** SAPHNELO puede reducir la actividad del sistema inmunitario. Los medicamentos que afectan el sistema inmunitario pueden aumentar el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer.

Algunos de los efectos secundarios más frecuentes de SAPHNELO:

- Infecciones de las vías respiratorias superiores
- Bronquitis
- Reacciones a la infusión
- Culebrilla (herpes zóster)
- Tos

Las reacciones a la infusión pueden ocurrir en el momento de la infusión o poco después de esta. Los síntomas pueden incluir dolor de cabeza, náuseas, vómitos, sensación de cansancio o debilidad (fatiga) y mareos.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de SAPHNELO. Llame a su proveedor de atención médica para obtener asesoramiento médico acerca de los efectos secundarios.

USO APROBADO

SAPHNELO es un medicamento de venta con receta que se usa para tratar a adultos con lupus eritematoso sistémico (LES o lupus) de moderado a grave que reciben otros medicamentos para combatir el lupus.

Se desconoce si SAPHNELO es eficaz en pacientes con nefritis lúpica activa grave o lupus activo del sistema nervioso central grave. Se desconoce si SAPHNELO es seguro y eficaz en pacientes menores de 18 años.

Consulte la [Información de seguridad importante](#) adicional en su totalidad y la [Información de prescripción completa](#), incluida la [Información para el paciente](#).

Puede [informar efectos secundarios relacionados con los productos de AstraZeneca](#). 